

TOKSIČNA MIOPATIJA – PRIKAZ SLUČAJA TOXIC MYOPATHY – A CASE REPORT

Valentina Župetić¹, Ivana Papić¹

¹Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju, Klinika za unutarnje bolesti, KBC Zagreb

Miopatije kao bolesti skeletnog mišića mogu biti rezultat upale u sklopu autoimune bolesti, genetskog ili metaboličkog poremećaja, infekcije, djelovanja lijekova i drugo. Kada govorimo o toksičnoj miopatiji govorimo o miopatiji uzrokovanoj štetnim djelovanjem tvari koje unosimo u organizam, najčešće lijekovima. Najčešća miopatija uzrokovana lijekovima je statinska miopatija, uzrokovana uzimanjem statina, lijeka za snižavanje kolesterola u krvi. U oko 10% bolesnika se javljaju mišićne tegobe 1 do 6 mjeseci nakon početka uzimanja terapije ili povišenja doze. U prikazu slučaja riječ je o pacijentici kojoj se kao nusnalaz u sklopu inicijalne obrade bilježi značajan porast kreatin-kinaze s mišićnom slabošću uz podatak o početku uzimanja statina mjesec dana prije hospitalizacije. Daljnjom obradom postavlja se dijagnoza statinske miopatije te se započinje liječenje imunoglobulinima uz potpunu obustavu statina. Multidisciplinim pristupom dolazi do smanjenja tegoba pa sve do regresije bolesti uz obavezno praćenje preporuka pri otpustu iz bolnice.

Ključne riječi: statini, miopatija, multidisciplinarni pristup

E-pošta glavnog autora: valentinazu5ic@gmail.com

Izjava o sukobu interesa: nema sukoba interesa