

KARDIOVASKULARNE MANIFESTACIJE SARKOIDOZE – REZULTATI ISTRAŽIVANJA U GRUPI OBOLJELIH OD SARKOIDOZE U REPUBLICI HRVATSKOJ

CARDIOVASCULAR MANIFESTATIONS OF SARCOIDOSIS – RESULTS OF RESEARCH IN THE REPUBLIC OF CROATIA

Ana Gudelj Gračanin ^{1,2}, Tea Čubelić ¹, Ana Šmaguc ¹

¹Odjel za kliničku imunologiju, reumatologiju i pulmologiju, Klinika za unutarnje bolesti, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb, Hrvatska

²Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Uvod: Sarkoidoza je sistemska, upalna bolest nepoznate etiologije koju karakterizira stvaranje granuloma u različitim organima. Najčešće zahvaća pluća i limfne čvorove, a među organima koji mogu biti zahvaćeni srce zauzima važno mjesto. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi učestalost kardiovaskularnih simptoma, kardioloških dijagnoza i terapije u grupi oboljelih od raznih oblika sarkoidoze u RH.

Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 88 ispitanika oboljelih od sarkoidoze. Najčešći oblici bili su plućna (62,8%), multisistemska (16,3%), kožna (7%), srčana (5%) sarkoidoza te ostali rijetki oblici.

Rezultati: Kao vodeći kardiovaskularni simptom palpitacije je istaknulo 18.1%, tahikardiju 57.8%, bol u prsima 61.4%, gubitak svijesti 14.5% i zaduhu 53% svih ispitanika. Simptome s fizičkim naporom povezuje 24.7%, ne povezuje 59.3% ispitanika, dok 16% nije sigurno. Više puta tjedno navedene kardiovaskularne simptome osjeća 28.7%, svakodnevno 23.8%, više puta mjesečno 26.3%, rjeđe od jedan puta mjesečno 6.2% ispitanika. Kardiološku obradu i dijagnozu nema 68.4% ispitanika. Aritmije ima 22.8%, srčano zatajenje 2.5%, bolest srčanog zališka 6.3%, AV blok 3.8% ispitanika. Lijekove za kardiovaskularne bolesti uzima 51.2%, dok 48.8% ne uzima. Glukokortikoida u liječenju sarkoidoze uzima 43.8% ispitanika. Zbog kardiovaskularnih simptoma 62,5% ispitanika smanjilo je fizičku aktivnost, 20,9% promijenilo posao, a 23,5% bilo hospitalizirano, dok je subjektivni dojam općeg zdravlja svih ispitanika 50/100.

Zaključak: Srčana sarkoidoza rijedak je oblik sarkoidoze. Oboljeli od raznih oblika sarkoidoze imaju brojne kardiovaskularne simptome, iako većina nema kardiološku obradu i dijagnozu. Multidisciplinarni timovi u koje bi bili uključeni i kardiolozi ključni su u poboljšanju skrbi za oboljele od sarkoidoze.

Ključne riječi: sarkoidoza, kardiovaskularne manifestacije

E-pošta glavnog autora: agudeljgracanin@gmail.com

Izjava o sukobu interesa: nema sukoba interesa