

PARANEOPLASTIČNI RAYNAUDOV FENOMEN KOD BOLESNICE S UVEALNIM MELANOMOM – PRIKAZ SLUČAJA

PARANEOPLASTIC RAYNAUD'S PHENOMENON IN A PATIENT WITH UVEAL MELANOMA – A CASE REPORT

Sanda Špoljarić Carević ¹, Lara Vasari ¹, Danijela Kolarić Matešić ², Marija Bakula ³

¹Odjel za reumatologiju, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Naftalan, Ivanić Grad

²Odjel za fizikalnu medicinu, reumatologiju i rehabilitaciju, Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek", Koprivnica

³Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju, Klinika za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb

Uvod: Raynaudov fenomen (RF) predstavlja vazospastični poremećaj malih krvnih žila, koji se klinički očituje prolaznim epizodama akralne bljedoće, cijanoze i eritema, najčešće izazvanim izlaganjem hladnoći ili emocionalnim stresom. Javlja se u 3–5 % opće populacije, s četiri puta većom učestalošću kod žena. Paraneoplastični RF izuzetno je rijedak i najčešće je povezan s hematološkim i solidnim malignim bolestima. Mehanizmi uključuju hiperkoagulabilnost i povišenu viskoznost plazme. Klinički se paraneoplastični RF često očituje naglim nastupom, bolnim epizodama, ulceracijama, pa čak i nekrozom.

Prikaz slučaja: Predstavljamo slučaj 62-godišnje bolesnice koja je razvila RF s naglim nastankom, karakteriziran epizodama bljedila svih prstiju šaka, bez bolova, ulceracija ili nekroze, u trajanju od 10–15 minuta nakon izlaganja hladnoći. Bolesnici je tri mjeseca ranije dijagnosticiran uvealni melanom, uz anamnezu remisije invazivnog duktalnog karcinoma dojke unazad 14 godina. Laboratorijski nalazi pokazali su pozitivna antinuklearna protutijela (ANA) s PCNA uzorkom, kao i prisutnost mišićno-specifičnih autoantitijela: anti-Jo, AMA-M2 i anti-benzilpeniciloil (BPO) antitijela. U pacijentice je obradom isključeno prisustvo sistemske autoimunosne bolesti.

Zaključak: Iako paraneoplastični RF obično ima teži klinički tijek, u ovom slučaju riječ je o netipičnoj i blažoj prezentaciji, bez oštećenja tkiva. Nagli početak simptoma, pridružena onkološka dijagnoza te specifični serološki nalazi ukazuju na paraneoplastičnu etiologiju. Ovaj prikaz ističe važnost diferencijalne dijagnoze novonastalog RF, osobito u onkoloških bolesnika ili u prisutnosti atipičnih imunoloških nalaza.

Ključne riječi: Raynaudov fenomen, uvealni melanom, paraneoplastični sindrom, autoantitijela

E-pošta glavnog autora: ssanda1977@gmail.com

Izjava o sukobu interesa: nema sukoba interesa