

LIVEDOIDNA VASKULOPATIJA U PACIJENTICE S ANAMNEZOM PREBOLJELE COVID-19 INFEKCIJE TIJEKOM TRUDNOĆE: PRIKAZ SLUČAJA

LIVEDOID VASCULOPATHY IN A PATIENT WITH A HISTORY OF COVID-19 INFECTION DURING PREGNANCY: A CASE REPORT

Iva Domić¹, Ilenia Romić², Majda Vrkić Kirhmajer^{3,5}, Joško Mitrović^{4,5,6}, Jadranka Morović-Vergles^{4,5}

¹Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom, Klinička bolnica Dubrava, Zagreb, Hrvatska

²Odjel za opću internu medicinu, Opća bolnica Dubrovnik, Dubrovnik, Hrvatska

³Zavod za bolesti krvnih žila, Klinika za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Hrvatska

⁴Zavod za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju, Klinika za internu medicinu, Klinička bolnica Dubrava, Zagreb, Hrvatska

⁵Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

⁶Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Uvod: Livedoidna vaskulopatija rijetka je kronična bolest krvnih žila koja najčešće zahvaća male krvne žile potkožja. Karakterizira ju ponavljajuća pojava livedoidnih promjena po koži, atrofični bijeli plakovi i ulceracije. Kožne promjene tipično se pojavljuju obostrano na potkoljenicama, nožnim zglobovima i stopalima. Livedoidna vaskulopatija često se povezuje s hiperkoagulabilnim stanjima, sistemskim autoimunim bolestima i malignim bolestima.

Prikaz slučaja: Prikazujemo slučaj prethodno zdrave 31-godišnje žene s anamnezom preboljele COVID-19 infekcije tijekom trudnoće, dvije godine prije pojave livedoidnih promjena na koži. Pacijentica se javila hematologu s anamnezom eritematoznih do livedoidnih makula i mrlja na dorzumu stopala, nožnim zglobovima i na potkoljenicama uz blago oticanje nožnih zglobova u trajanju od dva mjeseca. Učinjene biopsije kože s nekoliko lokalizacija patohistološki su prikazale trombe, fibrinoidne vaskularne promjene, fibrozu i hijalinizaciju stijenki krvnih žila – nalaze tipične za vaskulopatiju. Inicijalno je započeta primjena niskomolekularnog heparina (dalteparin).

Zaključak: Ovaj prikaz slučaja naglašava važnost ranog prepoznavanja, izvođenja biopsije kože sa sljedstvenom patohistološkom dijagnozom i odgovarajućeg liječenja ovog rijetkog, ali potencijalnog ugrožavajućeg stanja.

Ključne riječi: livedoidna vaskulopatija; trudnoća, COVID-19 infekcija, antikoagulantna terapija

E-pošta glavnog autora: iva.pozderac@gmail.com

Izjava o sukobu interesa: nema sukoba interesa