https://doi.org/10.33004/reumatizam-supp-73-1-5

Neurološke manifestacije antifosfolipidnog sindroma
Neurological manifestations of antiphospholipid syndrome

Joško Mitrović [1]

[1]*Klinička bolnica Dubrava*

Antifosfolipidni sindrom (APS) autoimuna je bolest obilježena trombotskim i opstetričkim manifestacijama povezanima s prisutnošću antifosfolipidnih protutijela. Neurološke manifestacije česte su u APS-u i obuhvaćaju širok spektar poremećaja koji mogu nastati kao posljedica vaskularne tromboze, ali i netrombotskih mehanizama, uključujući aktivaciju komplementa, poremećaj krvno-moždane barijere i izravno protutijelima posredovano oštećenje neurona.
Ishemijski moždani udar i tranzitorna ishemijska ataka najčešće su neurološke manifestacije, pri čemu na APS osobito treba posumnjati u mlađih bolesnika s cerebrovaskularnim događajem bez uobičajenih čimbenika rizika. Ishemijski moždani udar može nastati zbog in situ tromboze ili kardioembolijskog mehanizma. APS je povezan i s trombozom cerebralnih vena te Sneddonovim sindromom. Važno mjesto zauzimaju kognitivni poremećaji, koji mogu varirati od blažih deficita do teškog kognitivnog oštećenja te su često povezani s multifokalnim lezijama bijele tvari na magnetskoj rezonanciji. Nadalje, mogući su i epileptički napadaji, psihoza, koreja, migrena, klinička slika nalik multiploj sklerozi, transverzalni mijelitis, senzorineuralni gubitak sluha te periferne neuropatije. Antagonisti vitamina K ostaju temelj liječenja trombotskog APS-a, dok su dokazi za optimalno liječenje netrombotskih neuroloških manifestacija još uvijek ograničeni. Poznavanje širokog neurološkog spektra APS-a ključno je za pravodobnu dijagnozu, diferencijalnu dijagnostiku i individualizirani terapijski pristup.

Ključne riječi: antifosfolipidni sindrom, antifosfolipidna protutijela, neurološke manifestacije
Keywords: antiphospholipid syndrome, antibodies, antiphospholipid, neurologic manifestations
E-mail adresa prezentirajućeg autora: jmitrovi@kbd.hr
Izjava o sukobu interesa: nema sukoba interesa