https://doi.org/10.33004/reumatizam-supp-73-1-44

Aseptični pahimeningitis i neuropatija tankih vlakana kao neurološke manifestacije primarnog Sjögrenova sindroma: prikaz bolesnice

Aseptic pachymeningitis and small fibre neuropathy as neurological manifestations of primary Sjögren's syndrome: a case report

Martina Held [1], Marija Šćepović-Ljucović [1], Tereza Gabelić [2], Miroslav Mayer [1,3]

[1]Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju, Referentni centar za sustavni eritemski lupus Ministarstva zdravstva RH, Klinika za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta, Klinički bolnički centar Zagreb
[2]Klinika za neurologiju Medicinskog fakulteta, Klinički bolnički centar Zagreb
[3]Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Uvod: Zahvaćanje središnjeg i perifernog živčanog sustava značajna je ekstraglandularna manifestacija primarnog Sjögrenova sindroma, prisutna u približno 20 % bolesnika, a u 25–60 % slučajeva neurološki simptomi prethode dijagnozi. Aseptični pahimeningitis rijetka je početna manifestacija bolesti. Prikazujemo bolesnicu u koje je bolest započela aseptičnim pahimeningitisom, uz kasniji razvoj neuropatije tankih vlakana i autonomne disfunkcije.
Prikaz slučaja: Bolesnica u dobi od 51 godine, s Hodgkinovim limfomom u remisiji 30 godina, liječena od 2018. zbog migrene i anksiozno-depresivnog poremećaja, hospitalizirana je u prosincu 2024. zbog febriliteta, glavobolje, fotofobije, fonofobije i bolova u leđima. U likvoru je nađena limfocitna pleocitoza s proteinorahijom i poremećajem krvno-likvorske barijere, uz negativnu opsežnu mikrobiološku obradu. MR mozga i leđne moždine prikazao je imbibiciju dure u skladu s pahimeningitisom te blagu cerebelarnu atrofiju. Tegobe su se povukle nakon glukokortikoida. Utvrđena su pozitivna ANA, anti-SS-Ai anti-Yo protutijela te povišen reumatoidni faktor. Anamnestički i objektivno potvrđeni su sicca simptomi, Raynaudov fenomen, migratorne artralgije, afte, nespecifične kožne promjene i simptomi autonomne disfunkcije. Zbog anti-Yo protutijela učinjen je PET-CT koji nije prikazao metabolički aktivno sijelo maligne bolesti. Zbog smetnji ravnoteže, alodinije i parestezija ekstremiteta učinjeno je kvantitativno senzorno testiranje kojim je potvrđena neuropatija tankih vlakana, a testiranjem autonomnoga živčanog sustava i njegova disfunkcija. Uvedeni su hidroksiklorokin i pregabalin, a zbog zahvaćanja perifernoga živčanog sustava primijenjena su dva ciklusa intravenskih imunoglobulina u dozi 2 g/kg.
Zaključak: Aseptični pahimeningitis može biti početna manifestacija primarnog Sjögrenova sindroma, koji tijekom bolesti može zahvatiti središnji, periferni i autonomni živčani sustav. Nalaz anti-Yo protutijela bez dokazane maligne bolesti otvara pitanje njihova doprinosa cerebelarnom zahvaćanju. Složenost kliničke slike naglašava potrebu za suradnjom reumatologa i neurologa te individualiziranim terapijskim pristupom.

Ključne riječi: Sjögrenov sindrom, pahimeningitis, neuropatija tankih vlakana, autonomna disfunkcija
Keywords: Sjögren's syndrome, pachymeningitis, small fibre neuropathy, autonomic dysfunction
E-mail adresa prezentirajućeg autora: martinaheld17129@gmail.com
Izjava o sukobu interesa: nema sukoba interesa